

BRODILUX PASTE

Lokmiddel klaar voor gebruik in pastavorm (RB) - RODENTICIDE (PT14)

Gewarborgde samenstelling: 0,0029 % brodifacoum (CAS 56073-10-0)

Toelatingsnummer : BE2018-0006

Toelatingshouder / Leverancier: **ZAPI S.p.A.** Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Italië - Tel. +39 049 9597737

KENMERKEN

BRODILUX PASTE is een lokaaspasta klaar voor gebruik in sachets van 15 gr. ter bestrijding van huismuizen en bruine ratten in alle ontwikkelingsstadia. Het bevat het 2de generatie anticoagulant brodifacoum als actieve stof. Deze werkt reeds na een enkele opname. Door zijn werkingsmechanisme sterven de dieren zonder achterdocht tegen het lokaas bij andere leden van de kolonie te waken.

BRODILUX PASTE beschikt over de volgende innovatieve en gepatenteerde eigenschappen:

- FLUO-NP® technologie: dankzij de fluorescerende pigment technologie kan het lokaas zelfs onder slechte lichtcondities makkelijk geïdentificeerd. Als het lokaas is gegeten, maakt de fluorescerende formulering de faeces van de knaagdieren onder UV licht duidelijk zichtbaar en biedt het de mogelijkheid om de knaagdieractiviteit te monitoren.
- PASTA PLUS (European Patent n° 1 279 334 B1): een gepatenteerde formulering bestaande uit een uitgebalanceerde combinatie van voedselcomponenten, zoals melkpoeder, suiker en vetten, aangevuld met granen zeer smakelijk voor knaagdieren.

Dankzij zijn smakelijkheid is het lokaas uiterst veelzijdig toepasbaar en wordt het gebruik aanbevolen op plaatsen waar een sterke concurrentie is met andere voedingsmiddelen.

BRODILUX PASTE bevat een aversie opwekkende stof (Denatonium Benzoaat) om consumptie door de mens te voorkomen.

Gebruik 1 - Huismuizen - groot publiek - gebruik binnen (Brodilux Paste)

Mus musculus-jonge en volwassen dieren-Huismuis

Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten.

Dosering en frequentie van de toepassing

Bevestig tot 3 zakjes (45g) in een veilige niet makkelijk te openen lokdoos met 5 m afstand tussen de lokdozen (2m in geval van een ernstige besmetting) in de zones waar de muizen actief zijn.

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het lokaasdoosje dient 2 of 3 dagen na begin van de bestrijdingsactie en hierna wekelijks geïnspecteerd te worden om te controleren of het lokaas wordt gegeten en om dode dieren te verwijderen. Navullen indien nodig.

Gebruik 2 - Ratten - groot publiek - gebruik binnen (Brodilux Paste)

Gebruik 3 - Ratten - groot publiek - gebruik buiten rond gebouwen (Brodilux Paste)

Rattus norvegicus-jonge en volwassen dieren-bruine rat

Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten.

Dosering en frequentie van de toepassing

Bevestig tot 6 zakjes (90g) in een veilige niet makkelijk te openen lokdoos met 10 m afstand tussen de lokdozen (5m in geval van een ernstige besmetting) in de zones waar de ratten actief zijn.

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De lokaasdozen dienen voor ratten - pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Buiten rond gebouwen: plaats de lokdozen in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in lokdozen waar lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

Algemene gebruiksaanwijzingen

Gebruiksvoorschrift

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppt, alvorens het product te gebruiken.

Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.

Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het geïnfecteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.

Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).

Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.

De zakjes met het lokaas niet openen.

Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doelidsoorten.

Verwijder houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiemee.

Plaats lokaasdozen niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelingsperiode.

Risicobeperkende maatregelen

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (hollen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. Gebruik geen lokaas met brodifacoum actieve bestanddelen als permanent lokaas (voor de voorkoming van een knaagdieren besmetting of voor het vaststellen van knaagdierenactiviteit).

Uitsluitend gebruiken in tamper resistent lokdozen.

Etiketleer lokdozen conform de productaanbevelingen. Door het gebruik van dit product zou de knaagdieren overlast binnen de 35 dagen moeten gestopt zijn.

De gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het einde van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

Zoek en verzamel op regelmatige tijdstippen de dode knaagdieren kadavers, minstens bij elke controle van de lokdozen. Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten.

Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming.

Gevenaarsaanduidingen

Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen - Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Inhoud afvoeren naar de lokale regelgeving.

Gefahrenhinweise

Kann die Organe schädigen (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise

Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt den lokalen Bedingungen entsprechend zuführen.



WAARSCHUWING/ACHTUNG

EERSTE HULP MAATREGELEN

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals: een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloedingstoringen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

Tegengif: Vitamine K1, uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van:

blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelwastof of water, oogleden tenminste tien minuten open houden.

blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen of contact opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245). Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts of contact opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245). Gevaarlijk voor dieren in het wild.

Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie:

"niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "BRODILUX PASTE - toelatingsnummer BE2018-0006";

"Actieve stof: Brodifacoum" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245)"

waarborg

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortvloeiende uit het gebruik van door ons niet gecontroleerde toepassingen.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Bij elke controle en Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het einde van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten. De verpakking en (ongetegete) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming. Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken. Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken. Gebruik van handschoenen wordt aanbevolen.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaar in de gesloten verpakking verwijderd van direct zonlicht.

Bewaar buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren en hoevedieren.

Houdbaarheid: 24 maanden.

Overige informatie

Omwille van hun uitgestelde werking kan de doeltreffendheid van rodenticiden op basis van anticoagulantia pas worden waargenomen vanaf 4 tot 10 dagen na consumptie van het lokaas.

Knaagdieren kunnen drager zijn van ziekten. Raak de dode knaagdieren niet aan met blote handen, gebruik handschoenen of een tang bij de verwijdering van de kadavers.

Dit product bevat een bitterstof en kleurstof.



a Pelsis Group Brand  pelsis



Verdeeld door/Distribué par:
Pelsis Belgium NV
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60
www.edialux.com • info@edialux.be

BRODILUX PASTE

Appât (prêt à l'emploi) (RB) en pâte - RODENTICIDE (TP14)

Composition garantie: 0,0029 % brodifacoum (CAS 56073-10-0)

Numéro d'autorisation: BE2018-0006

Détenteur de l'autorisation / Fournisseur:

ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Italie - Tel. +39 049 9597737

CARACTÉRISTIQUES ET USAGE

BRODILUX PASTE est un appât en pâte prêt à l'emploi, conditionné dans des sachets individuels de 15 g pour le traitement des souris domestiques et des rats bruns, à tous les stades de développement, qui contient une substance très puissante, le brodifacoum, un anticoagulant de deuxième génération, agissant après une seule ingestion. Grâce à son mécanisme d'action, la mort des rongeurs survient sans éveiller la méfiance des autres membres de la colonie.

Le rodenticide BRODILUX PASTE présente les caractéristiques innovantes et brevetées suivantes :

- Technologie FLUO-NP® : grâce à la technologie du colorant fluorescent, l'appât peut être facilement détecté, même dans de mauvaises conditions d'illumination. Lorsque l'appât est mangé par les rongeurs, la formulation fluorescente rend les fèces des rongeurs clairement visibles sous la lumière UV, ce qui donne la possibilité de surveiller l'activité des rongeurs.

- PASTA PLUS (Brevet européen n° 1 279 334 B1) : une formulation brevetée combinant un mélange bien équilibré de composants d'origine alimentaire, tels que farine lactée, sucre et graisses enrichies en céréales, particulièrement appétissantes pour les espèces de rongeurs mentionnées précédemment. Grâce à sa forte appétence, l'appât est extrêmement polyvalent; son usage est indiqué dans des zones présentant une forte concurrence alimentaire. BRODILUX PASTE intègre un agent d'aversión (Benzoate de Dénatonium) pour aider à prévenir la consommation humaine.

Utilisation 1 - Grand public - souris - intérieur (Brodilux Paste)

Mus musculus - Juveniles et Adultes - Souris domestique

Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des boîtes d'appâtage sécurisées.

Taux et fréquences d'application

Fixer 3 sachet (45g) dans des stations d'appât inviolables espacées de 5m (espacées de 2m dans les zones à forte infestation) dans les zones où les souris sont actives.

Consignes d'utilisation spécifiques

Les postes d'appâtage doivent être inspectés au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Utilisation 2 - Grand public - rats - intérieur (Brodilux Paste)

Utilisation 3 - Grand public - rats - extérieur autour des bâtiments (Brodilux Paste)

Rattus norvegicus - Juveniles et adultes - rongeurs-rat brun

Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des boîtes d'appâtage sécurisées.

Taux et fréquences d'application

Fixer jusqu'à 6 sachets (90g) dans des stations d'appât inviolables espacées de 10m (espacées de 5m dans les zones à forte infestation) dans les zones où les rats sont actifs.

Consignes d'utilisation spécifiques

Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments: placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Consignes d'utilisation

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcs, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.

Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

Mesures de gestion des risques

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs).

A utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement.

Étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit.

L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.

En cas de suspicion d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

Rechercher et éliminer les cadavres des rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés.

Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale. Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée.

Mentions de danger

Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence

Consulter un médecin en cas de malaise. Garder sous clé. Éliminer le contenu dans le respect de la réglementation locale.



ATTENTION

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

Antidote : Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

En cas :

- d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse ;

- d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes ;

- d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin ou le Centre Antipoisons (tél 070 245 245) et présentez-le contenant du produit ou l'étiquette. Contacter un vétérinaire ou le Centre Antipoisons (tél 070 245 245) en cas d'ingestion par un animal domestique.

Dangereux pour la faune.

Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes : « ne pas déplaçer ni ouvrir » ; « contient un rodenticide » ; « BRODILUX PASTE - N° d'Autorisation BE2018-0006 » ; « Substance active : Brodifacoum » et « en cas d'incident, contacter le Centre Antipoisons (tél 070 245 245) ».

garantie

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous.

Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À chaque inspection et une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale. L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée. Ceci afin de limiter le risque d'ingestion et d'empoisonnement des enfants, animaux de compagnie et autres animaux. L'utilisation de gants est recommandée.

Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conservé le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

Durée de conservation : 24 mois à partir de la date de production

Autres informations

En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.

Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pincettes pour les éliminer.

Ce produit contient un agent émulsifiant et un colorant.



a Pelsis Group Brand 



Verdeeld door/Distribué par:
Pelsis Belgium SA
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60
www.edialux.com • info@edialux.be