

## FATAL PASTA AM

Lokmiddel klaar voor gebruik (RB)

Gewaarborgde samenstelling: 0,0025 % brodifacoum (CAS 56073-10-0)

Toelatingsnummer : BE2017-0001

Toelatingshouder : PelGar International Ltd, rue des Remparts d'Ainay 18, FR 69002 Lyon, Tel: +33 472 15 78 51

### GEbruIK

FATAL® PASTA AM is een vettig, deegachtig lokaas ter bestrijding van ratten en muizen door niet-professionelen. De speciale samenstelling van FATAL® PASTA AM garandeert een goede opname door knaagdieren. FATAL® PASTA AM bevat een krachtig bloedstollingremmend middel. Eén enkele opname kan al voldoende zijn voor het doden van het knaagdier. De dood treedt pas op enkele dagen na consumptie van het lokaas, zodat lokaasschuwheid uitgesloten is.

### Gebruik 1 - Huismuizen - groot publiek - gebruik binnen (Fatal Pasta AM)

*Mus musculus*-jonge en volwassen dieren-Huismuis

Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.

### Dosering en frequentie van de toepassing

Bevestig 1 zakje (15g) in een veilige niet makkelijk te openen lokdoos met 5 m afstand tussen de lokdozen (2m in geval van een ernstige besmetting) in de zones waar de muizen actief zijn.

Controleer het lokaas verbruik regelmatig en vervang het met vers lokaas. Herhaal de behandeling in situaties waar er aanwijzingen zijn voor een nieuwe besmetting (bijv. verse sporen of uitwerpselen). Muizen zijn erg nieuwsgierig, dus is het raadzaam om het lokaas om de 2-3 dagen te verplaatsen. Dit kan gedaan worden bij het controleren en aanvullen van het lokaas. Controleer het verbruik de eerste 10-14 dagen regelmatig. Vervang het lokaas wanneer het nat of vuil is, of als er een deel van is opgegeten. Verhoog het aantal lokaasdozen als al het lokaas is verbruikt. Overschrijd de voorgeschreven dosis niet.

### Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen minstens elke 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna wekelijks om te controleren of het lokaas wordt opgenomen en of het lokaas intact is en om kadavers van dode knaagdieren te verwijderen. Vul lokaas opnieuw wanneer nodig. Door het gebruik van dit product zou de knaagdieren overlast binnen de 35 dagen moeten gestopt zijn. Bij een vermoeden van een gebrek aan werking aan het eind van de behandeling (bv knaagdierenactiviteit wordt nog steeds vastgesteld), moet de gebruiker de fabrikant raadplegen of een pest controller inschakelen. Het product niet toepassen als permanent lokaas, lokaas ook niet geschikt voor toepassing met de puls-baiting techniek.

### Gebruik 2 - Ratten - groot publiek - gebruik binnen (Fatal Pasta AM)

### Gebruik 3 - Ratten - groot publiek - gebruik buiten rond gebouwen (Fatal Pasta AM)

*Rattus norvegicus*-jonge en volwassen dieren-bruine rat

Klaar voor gebruik lokaas. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.

### Dosering en frequentie van de toepassing

Tegen ratten: 1-4 x 15g zakjes 5-10m verwijderd van elkaar. Bevestig de zakjes in een veilige niet makkelijk te openen lokdoos, afstand tussen de lokaasdozen 10 m (5 m in geval van ernstige besmetting) te gebruiken in zones waar ratten activiteit wordt waargenomen.

### Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Na het uitleggen van het lokaas, de lokaaspunten gedurende enkele dagen niet verplaatsen of versturen. Als er na 7 tot 10 dagen geen teken van rattenactiviteit wordt waargenomen rond het lokaas, verplaats het lokaas dan naar een zone met meer rattenactiviteit. Controleer regelmatig de opname van het lokaas en vervang het geconsumeerde of bedorven lokaas tot het verbruik is gestopt. Herhaal de behandeling in situaties waar er sprake is van nieuwe besmetting (bijvoorbeeld verse sporen of uitwerpselen). Na het uitleggen van het lokaas, de lokaaspunten gedurende enkele dagen niet verplaatsen of versturen. Als er na 7 tot 10 dagen geen teken van rattenactiviteit wordt waargenomen rond het lokaas, verplaats het lokaas dan naar een zone met meer rattenactiviteit. Als al het lokaas uit bepaalde gebieden is opgegeten, vergroot dan de hoeveelheid lokaas door meer lokaaspunten te plaatsen. Verhoog de dosis van het lokaas niet. Vervang aas dat door knaagdieren is opgegeten of dat door water is beschadigd of door vuil is verontreinigd. Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen pas na 5 tot 7 dagen bezocht worden en daarna wekelijks om te controleren of het lokaas wordt opgenomen en of het lokaas intact is en om kadavers van dode knaagdieren te verwijderen. Vul lokaas opnieuw wanneer nodig. Door het gebruik van dit product zou de knaagdieren overlast binnen de 35 dagen moeten gestopt zijn. Bij een vermoeden van een gebrek aan werking aan het eind van de behandeling (bv knaagdierenactiviteit wordt nog steeds vastgesteld), moet de gebruiker de fabrikant raadplegen of een pest controller inschakelen. Het product niet toepassen als permanent lokaas, lokaas ook niet geschikt voor toepassing met de puls-baiting techniek.

### Algemene gebruiksaanwijzingen

#### Gebruiksvoorschrift

Lees en volg de product informatie alsook elke begeleidende informatie van het product of informatie verstrekt bij de aankoop van het product vóór het gebruik. Voorzie preventieve controle maatregelen (bv. holen dichtmaken, verwijder mogelijk voedsel en drank voor de knaagdieren zo ver mogelijk) dit bevordert de opname van het product en vermindert de kans op een nieuwe besmetting. Alvorens rodenticiden te gebruiken, moet men overwegen om niet chemische controle methoden (vb vallen) in te zetten. Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor de knaagdieren (bv gemorst graan of voedselafval). Afgezien van dit, reinig de besmette zone niet voor de behandeling, dit zou de knaagdieren populatie kunnen verstören waardoor de opname van het lokaas moeilijker wordt bereikt.

Zakjes die lokaas bevatten niet openen (enkel in geval van zakjes, niet bij losse lokaas).

Lokaasdozen moeten geplaatst worden in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdieren activiteit werd vastgesteld. Waar mogelijk moeten lokaasdozen in de grond of andere structuren worden verankerd. Wanneer lokaas in de buurt van water drainage systemen wordt ingezet, zorg er dan voor dat het product niet in contact komt met water.

Lokaasdozen verwijderd houden van voedsel, drank of dierenvoeder, als ook toestellen of oppervlakken die hiermee in contact kunnen komen.

Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, hoevedieren en andere niet-doeldieren. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Was de handen en de huid direct na gebruik van het product.

#### Risicobeperkende maatregelen

Gebruik geen lokaas met brodifacoum actieve bestanddelen als permanent lokaas (voor de voorkoming van een knaagdieren besmetting of voor het vaststellen van knaagdierenactiviteit).

Kadavers van dode knaagdieren verwijderen in overeenstemming met de lokale voorschriften. Zoek en verzamel op regelmatige tijdstippen de dode knaagdieren kadavers, minstens bij elke controle van de lokdozen. Door het gebruik van dit product zou de knaagdieren overlast binnen de 35 dagen moeten gestopt zijn.

### VEILIGHEID

Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Stof niet inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud en verpakking naar een inzamelpunt voor gevarenlijk of bijzonder afval afvoeren

#### SICHERHEIT

Kann die Organe (Blut) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition . Staub nicht einatmen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Inhalt und Behälter nach einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfall zuführen.

### WAARSCHUWING/ ACHTUNG



### EERSTE HULP MAATREGELEN

Dit product bevat een anticoagulerende stof. Bij inslikken, kunnen symptomen, vertraagd voorkomen, dit kan zijn neusbloedingen en bloedend tandlees. In ernstige gevallen kan dit leiden tot bloedingen en blauwe plekken op de huid en bloed in de urine of stoelgang. Tegengif: Vitamine K1 enkel toegediend door arts of medisch personeel/ dierenarts.

In geval van: Dermale blootstelling, was de huid met water en daarna met water en zeep. Contact met de ogen, spoel de ogen met een oogreinigingsmiddel of spoel met water gedurende 10 minuten en hou de oogleden geopend. Orale blootstelling, spoel voorzichtig de mond met water. Nooit iets toedienen door de mond bij een bewusteloze persoon. Geen braken opwekken. Bij inslikken, onmiddellijk medisch advies inwinnen en de verpakking of etiket tonen. Raadpleeg een dierenarts in geval van inslikken van het product door een huisdier. Gevaarlijk voor wilde diersoorten.

Tel. Antigifcentrum 070 245 245

### waarborg

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortkomende van door ons niet gecontroleerde toepassing.

### Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Op het einde van de behandeling, verwijder het niet geconsumeerde lokaas en de verpakking in overeenstemming met de lokale voorschriften. Het gebruik van handschoenen is aangewezen. Inhoud en verpakking afvoeren als gevarenlijk afval in overeenstemming met de lokale voorschriften.

### Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Bewaar in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaar in de gesloten verpakking verwijderd van direct zonlicht.

- Bewaar buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren en hoevedieren.

- Houdbaarheid: 24 maanden.

- In originele verpakking bewaren.

### Overige informatie

- Lokaasdozen moeten geëtiketteerd zijn me volgende informatie: "niet aanraken of openen"; "bevat een rodenticide"; "Fatal pasta AM BE2017-0001"; "Brodifacoum" en "in geval van een incident, contacteer het Antigifcentrum 070 245 245"

- Gevaarlijk voor wilde diersoorten.

- Omwille van hun uitgestelde werking kan de doeltreffendheid van rodenticiden op basis van anticoagulatia pas worden waargenomen vanaf 4 tot 10 dagen na consumptie van het lokaas.

- Knaagdieren kunnen drager zijn van ziekten. Raak de dode knaagdieren niet aan met blote handen, gebruik handschoenen of een tang bij de verwijdering van de kadavers. - Dit product bevat een bitterstof en kleurstof.



 **EDIALUX**  
HOME-PET-PLANT PROTECTION

© Pelsis Group Brand  **pelsis**

Verdeeld door :

Pelsis Belgium NV

Industrieweg 15 • B-2880 Bornem

Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60

[www.edialux.com](http://www.edialux.com) • [info@edialux.be](mailto:info@edialux.be)

V-1615

# FATAL PÂTE AM

Appât(prêt à l'emploi)(RB)

Composition garantie: 0,0025 % brodifacoum (CAS 56073-10-0)

Numéro d'autorisation: BE2017-0001

Détenteur de l'autorisation: PelGar International Ltd, rue des Remparts d'Ainay 18, FR 69002 Lyon, Tel: +33 472 15 78 51

## USAGE

FATAL® PASTA AM est un appât gras pâteux pour la lutte contre LES RATS ET LES SOURIS. La composition spécifique de FATAL® PASTA AM assure une appétence optimale. FATAL® PASTA AM contient un puissant anticoagulant. Une seule ingestion peut déjà être suffisante pour tuer le rongeur. La mort survient quelques jours après la consommation de l'appât, sans éveiller la méfiance des rongeurs vis-à-vis de l'appât.

## Utilisation 1 - Grand public\_souris\_intérieur (Fatal Pasta AM)

Mus musculus-Juvéniles et Adultes-Souris domestique

Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des boîtes d'appâillage sécurisées.

### Taux et fréquences d'application

Fixer 1 sachet (15g) dans des stations d'appât inviolables espacées de 5m (espacées de 2m dans les zones à forte infestation) dans les zones où les souris sont actives.

Vérifiez à intervalles réguliers la consommation des appâts et le remplacer avec des produits frais. Répétez le traitement dans les situations où il existe des indications d'une nouvelle infestation (par exemple, des traces fraîches ou des excréments). Les souris sont très curieuses, il est donc conseillé de déplacer les appâts dans les 2-3 jours. Cela peut être fait lors de la vérification et du réapprovisionnement de l'appât. Vérifiez l'appât les 10-14 premiers jours de manière régulière. Remplacer l'appât lorsqu'il est mouillé ou sale, ou s'il y a une partie mangée. Augmenter le nombre de points d'appât si tout l'appât a été consommé. Ne pas dépasser la dose prescrite au point d'appât.

### Consignes d'utilisation spécifiques

Les points d'appât doivent être vérifiés au moins tous les 2 à 3 jours au début du traitement et au moins une fois par semaine, afin de vérifier si l'appât est accepté, si les points d'appât sont intacts et d'éliminer les corps des rongeurs. Remplissez l'appât si nécessaire. L'utilisation de ce produit devrait éliminer les rongeurs dans les 35 jours. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de suspicion de manque d'efficacité à la fin du traitement (l'activité des rongeurs est toujours observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou appeler un service de contrôle. N'utilisez pas ce produit pour un appât permanent ou pulsé.

## Utilisation 2 - Grand public -rats- intérieur (Fatal Pasta AM)

## Utilisation 3 - Grand public -rats- extérieur autour des bâtiments (Fatal Pasta AM)

Rattus norvegicus-Juvéniles et adultes rongeurs-rat brun

Appât prêt à l'emploi en sachet à utiliser dans des postes d'appâillage sécurisées.

### Taux et fréquences d'application

Pour rats : 1-4 x 15g sachets espacés de 5 - 10 m. Fixer sachets dans des stations d'appât inviolables espacées de 10m (espacées de 5m dans les zones à forte infestation) dans les zones où les rats sont actives.

### Consignes d'utilisation spécifiques

Ne bougez pas et ne dérangez pas les points d'appât pendant plusieurs jours après le placement de l'appât. Si aucun signe d'activité du rat n'est observé près de l'appât après 7 à 10 jours, déplacer l'appât vers une zone d'activité plus élevée. Vérifiez régulièrement la consommation d'appâts et remplacez les appâts consommés ou avariés jusqu'à ce que la consommation soit arrêtée. Répétez le traitement dans les situations où il y a des preuves d'une nouvelle infestation (par exemple des traces fraîches ou des fientes). Ne bougez pas et ne dérangez pas les points d'appât pendant plusieurs jours après le placement de l'appât.

Si aucun signe d'activité du rat n'est observé près de l'appât après 7 à 10 jours, déplacer l'appât vers une zone d'activité plus élevée chez le rat. Si tous les appâts ont été consommés dans certaines zones, augmentez la quantité d'appât en plaçant plus de points d'appât. N'augmentez pas la taille du point d'appât. Remplacer tout appât mangé par les rongeurs ou qui a été endommagé par l'eau ou contaminé par la saleté.

Les stations d'appâitage doivent être inspectées seulement 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâillage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâillage si besoin. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de suspicion de manque d'efficacité à la fin du traitement (l'activité des rongeurs est toujours observée), demander conseil au fournisseur ou appeler un service de contrôle. Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent ou dans le cadre de traitements par appâillage pulsé.

### Consignes d'utilisation

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Envisagez la mise en œuvre de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Avant d'utiliser des produits rodenticides, des méthodes de contrôle non chimiques (par exemple, des pièges) doivent être envisagées. Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales épargnées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât (seulement pour les sachets, pas pour l'appât en vrac) Les stations d'appâillage doivent être placées dans le voisinage immédiat où l'activité des rongeurs a été observée. Les postes d'appâillage doivent, si possible, être fixées au sol ou à d'autres structures. Lorsque des postes d'appâillage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau. Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers. Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non ciblés. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.


### Mesures de gestion des risques

Ne pas utiliser d'appâts contenant du brodifacoum en guise d'appâts permanents pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale. Chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement, au moins aussi souvent que les points d'appât sont inspectés. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.

## SECURITE

Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Ne pas respirer les poussières. Consulter un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



ATTENTION

## INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. · Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

· En cas: d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse; d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes; d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenu du produit ou l'étiquette Tel. Centre Antipoison: 070 245 245. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. Dangereux pour la faune.

## garantie

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous.

### Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminer les appâts non consommés et l'emballage conformément aux exigences locales. L'utilisation de gants est recommandée. Eliminer les emballages et les appâts non utilisés comme des déchets dangereux conformément aux réglementations nationales.

### Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Gardez le contenu fermé et à l'abri de la lumière directe du soleil.

-Entrepôter dans des endroits interdits à l'accès des enfants, des oiseaux, des animaux de compagnie et des animaux de la ferme.

-Durée de conservation: 24 mois

-Conserver dans le récipient d'origine.

### Autres informations

- Chaque boîte d'appâillage doit être munie d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «Fatal pâte AM BE2017-0001»; «Brodifacoum» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison 070 245 245».

- Compte-tenu du mode d'action différent, les rodenticides anticoagulants peuvent prendre 4 à 10 jours pour être efficace, après la consommation effective de l'appât.

- Dangereux pour la faune.

- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les rongeurs morts à mains nues, utiliser des gants ou des ustensiles pour les récupérer.

- Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.



 EDIALUX  
HOME-PET-PLANT PROTECTION

a Pelsis Group Brand  pelsis

Distribué par :

Pelsis Belgium SA

Industrieweg 15 • B-2880 Bornem

Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60

www.edialux.com • info@edialux.be

V-1615