

# TARGET® BLOC

## TARGET® BLOC

Lokmiddel klaar voor gebruik (RB)

Gewaarborge samenstelling: 0,0025 % difethialone (CAS 104653-34-1)

Toelatingsnummer: BE2011-0013; Grooth. Lux.: 146/11/L-000

Toelatingshouder: Liphatech S.A.S.; Bonnel BP3; FR F-47480 Pont du Casse; tel: +33(0)553693570

TARGET® BLOC is een krachtig bloklokaas, samengeperst in paraffine. Hierdoor zijn de blokjes vochtbestendig en dus ideaal geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en omgevingen. Effectief voor de bestrijding van BRUINE RATTEN (*Rattus norvegicus*), ZWARTE RATTEN (*Rattus rattus*) en MUIZEN (*Mus musculus*). Uitsluitend te gebruiken in verzegelde lokaasdozen, tegen muizen en ratten binnenshuis en tegen ratten buiten, rond gebouwen.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.  
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Gebruik 1 - Huismuizen - gebruik binnen (Target bloc)

Huismuis (*Mus musculus*) - jonge en volwassen dieren

Lokaas klaar voor gebruik. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.

Dosering en frequentie van de toepassing

Bevestig 2 blokjes (40g) in een veilige niet makkelijk te openen lokdoos met 2 à 3 m afstand tussen de lokdozen (1 à 1,5 m in geval van een ernstige besmetting)

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De lokaasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

### Gebruik 2 - Ratten - gebruik binnen (Target bloc)

### Gebruik 3 - Ratten - gebruik buiten rond gebouwen (Target bloc)

Bruine rat (*Rattus Norvegicus*) & Zwarte rat (*Rattus Rattus*) - jonge en volwassen dieren

Lokaas klaar voor gebruik. Te gebruiken in veilige niet makkelijk te openen lokdozen.

Dosering en frequentie van de toepassing

Bevestig tot 10 blokjes (200 g) in een veilige niet makkelijk te openen lokdoos met 8 à 10 m afstand tussen de lokdozen (4 à 5 m in geval van een ernstige besmetting).

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De lokaasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de lokaasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Voor gebruik buiten

Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.

## ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppt, alvorens het product te gebruiken. Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen. Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfecteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdiervolstand alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt. Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdiervolstand is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.). Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt. Het zakje rond het blokje niet openen. Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doelsoorten. Lokaasdozen verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee. Wanneer lokaas in de buurt van water drainage systemen wordt ingezet, zorg er dan voor dat het product niet in contact komt met water. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product. Gevaarlijk voor dieren in het wild. Gevaarlijk voor honden en katten. Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelingsperiode.

## RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen. Gebruik geen lokaas met difethialone actieve bestanddelen als permanent lokaas (voor de voorkoming van een knaagdieren besmetting of voor het vaststellen van knaagdiervolstand). Omwille van hun uitgestelde werking kan de doeltreffendheid van rodenticiden op basis van anticoagulatie pas worden waargenomen vanaf 4 tot 10 dagen na consumptie van het lokaas. Door het gebruik van dit product zou de knaagdiervolstand overlast binnen de 35 dagen moeten gestopt zijn. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdiervolstand waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen. Kadavers van dode knaagdieren verwijderen in overeenstemming met de lokale voorschriften. Zoek en verzamel op regelmatige tijdstippen de dode knaagdieren kadavers, minstens bij elke controle van de lokdozen. Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. [Dode knaagdieren moeten worden geëlimineerd en vernietigd door een gespecialiseerd erkend bedrijf]. Knaagdieren kunnen drager zijn van ziekten. Raak de dode knaagdieren niet aan met blote handen, gebruik handschoenen of een tang bij de verwijdering van de kadavers. Lokaasdozen moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet aanraken of openen"; "bevat een rodenticide"; "Target bloc BE2011-0013"; "Difethialone" en "in geval van een vergiftiging, contacteer het Antigifcentrum 070 245 245". Dit product bevat een bitterstof en kleurstof.

## WAARSCHUWING/ ACHTUNG



### VEILIGHEID

Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud en verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren overeenkomstig de lokale reglementering.

### SICHERHEIT

Kann die Organe (Blut) schädigen bei längerer und wiederholter Exposition.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt und Behälter nach einer Sammelstelle für gefährliche oder besondere Abfall zuführen.

## EERSTE HULP MAATREGELEN

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine. Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

In geval van: - blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvoestof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.

- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen.

Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond.

Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

Tel. Antigifcentrum: 070 245 245 - Groothertogdom Luxemburg: (+352) 8002 5500

## WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortvloeiende van door ons niet gecontroleerde toepassingen.

## INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT EN ZIJN VERPAKKING

Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten. Verpakkingen en restanten (al dan niet geconsumeerd) van rodenticiden worden als gevaarlijk afval beschouwd. Verwijdering en vernietiging moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd erkend bedrijf.

## VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN DE HOUDBAARHEID VAN HET PRODUCT ONDER NORMALE OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Bewaar in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaar in de gesloten verpakking verwijderd van direct zonlicht. Bewaar buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren en hoedevieren. Houdbaarheid: 3 jaar.

In originele verpakking bewaren.

**EDIALUX**  
HOME-PET-PLANT PROTECTION  
a Pelsis Group Brand  **pelsis**

Verdeeld door:

Pelsis Belgium NV

Industrieweg 15 • B-2880 Bornem

Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60

www.edialux.com • info@edialux.be



V-1829

# TARGET® BLOC

## TARGET® BLOC

Appât (prêt à l'emploi) (RB)

Composition garantie: 0,0025 % diféthialone (CAS 104653-34-1)

Numéro d'autorisation: BE2011-0013; pour le G.-D. Lux.: 146/11/L-000

Détenteur de l'autorisation: Liphatech S.A.S.; Bonnel BP3; FR F-47480

Pont du Casse; tél: +33(0)553693570

TARGET® BLOC est un appât bloc puissant, comprimé en paraffine. Cela rend les blocs résistants à l'humidité et donc idéaux pour une utilisation dans des pièces et environnements humides. Effective pour la lutte contre les RATS BRUNS (*Rattus norvegicus*), les RATS NOIRS (*Rattus rattus*) et les SOURIS DOMESTIQUES (*Mus musculus*). A utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés uniquement, à l'intérieur contre les rats et les souris et à l'extérieur (autour des bâtiments) contre les rats.

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### Utilisation 1 - Souris - intérieur (Target Bloc)

Souris domestique (*Mus musculus*): juvéniles et adultes

Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des boîtes d'appâtage sécurisées.

*Taux et fréquences d'application*

Fixer jusqu'à 2 blocs (40g) dans des stations d'appât inviolables espacées de 2 à 3m

(espacées de 1 à 1,5 m dans les zones à forte infestation)

*Consignes d'utilisation spécifiques*

Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

### Utilisation 2 - Rats - intérieur (Target Bloc)

### Utilisation 3 - Rats - extérieur autour des bâtiments (Target Bloc)

Rat brun (*Rattus norvegicus*), Rat noir (*Rattus Rattus*) - juvéniles et adultes rongeurs

Appât prêt à l'emploi en sachet à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisées.

*Taux et fréquences d'application*

Pour rats : Fixer jusqu'à 10 blocs (200g) dans des stations d'appât inviolables espacées de 8 à 10 m

(espacées de 4 à 5 m dans les zones à forte infestation)

*Consignes d'utilisation spécifiques*

Les stations d'appâtage ne doivent être inspectées que 5 à 7 jours après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

*Pour une utilisation à l'extérieur*

Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

## CONSIGNES D'UTILISATION

Lisez et respectez les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'élevage, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.

Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Dangereux pour la faune. Dangereux pour les chiens et les chats. Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

## MESURES DE GESTION DES RISQUES

Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants contenant la substance active diféthialone en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). Compte-tenu du mode d'action différé, les rodenticides anticoagulants peuvent prendre 4 à 10 jours pour être efficace, après la consommation effective de l'appât. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de suspicion d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les cadavres des rongeurs conformément à la réglementation locale [Les rongeurs morts doivent être éliminés et détruits par une entreprise spécialisée ou agréée]. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les rongeurs morts à mains nues, utiliser des gants ou des ustensiles pour les récupérer. Chaque poste d'appâtage doit être munie d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «Target bloc BE2011-0013»; «Diféthialone» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison 070 245 245». Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.



## ATTENTION

### SECURITE

Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

## INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS

Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées. - Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

**En cas:** - d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse; d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau et garder les paupières ouvertes au moins 10 minutes; d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. Ne pas provoquer de vomissement. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette [insérer les informations nationales spécifiques]. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique. TEL Centre Antipoisons: 070 245 245 pour le G.-D. Luxembourg: (+352) 8002 5500

## GARANTIE

Nous garantissons la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous.

## CONSIGNES POUR UNE ÉLIMINATION SÛRE DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE

Une fois le traitement terminé, mettre au rebut l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, conformément à la réglementation locale [L'emballage et les restes (consommés ou non) de rodenticides sont considérés comme des déchets dangereux. L'enlèvement et la destruction doivent être effectués par une entreprise spécialisée ou agréée].

## CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION DU PRODUIT DANS DES CONDITIONS NORMALES DE STOCKAGE

Conservé le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage. Durée de conservation: 3 ans.



### Distribué par :

Pelsis Belgium SA

Industrieweg 15 • B-2880 Bornem

Tel : 03 886 22 11 • Fax : 03 886 24 60

www.edialux.com • info@edialux.be

